

Décès par surdoses à Ottawa, de 2000 à 2015

- D'après les données des cinq dernières années (2011-2015), 36 résidents d'Ottawa meurent d'une surdose **involontaire**¹ de drogue chaque année; cela correspond à 71 % de la moyenne annuelle de 51 surdoses mortelles. Les deux tiers des décès par surdose involontaire (soit 24 par année) étaient attribuables aux opioïdes.
- En 2015, année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, 48 résidents d'Ottawa sont morts d'une surdose involontaire; 60 % (29) de ces décès étaient dus aux opioïdes, et 14 étaient liés au **fentanyl**. Depuis 2014, le fentanyl est en cause dans la majeure partie des décès par surdose à Ottawa.
- Depuis 2001, le taux de décès par surdose involontaire à Ottawa est inférieur à celui du reste de l'Ontario. L'écart entre les deux s'est toutefois réduit en 2015, le taux de surdose augmentant de 32 % à Ottawa entre 2014 et 2015, mais de seulement 6 % dans le reste de l'Ontario.
- De 2000 à 2015, le taux de décès attribuables aux surdoses involontaires (toutes drogues confondues) a augmenté de 23 % à Ottawa et de 139 % dans le reste de l'Ontario.
- Dans le reste de l'Ontario, cette augmentation s'est produite graduellement entre 2000 et 2015, tandis qu'à Ottawa, on a observé une hausse marquée en 2009.
- L'augmentation du nombre de décès par surdose involontaire à Ottawa et dans le reste de l'Ontario est due à une hausse des décès par surdose accidentelle d'opioïdes.
- À Ottawa, le nombre de décès par surdose involontaire d'opioïdes était 2,7 fois plus élevé entre 2009 et 2015 (24 par année) qu'entre 2003 et 2008 (9 par année).
- En 2015, on a observé une augmentation du nombre de décès par surdose involontaire attribuables à d'autres substances que les opioïdes (19 cette année-là, comparativement à une moyenne annuelle de 11 les cinq années précédentes).
- En moyenne, les hommes sont 1,8 fois plus nombreux que les femmes à mourir de surdoses involontaires (2011-2015).
- En moyenne 88 % (21 par année) des décès par surdose involontaire d'**opioïdes** à Ottawa ont eu lieu chez des adultes de 20 à 59 ans (2011-2015).
- Il est impossible d'estimer de façon fiable le nombre de surdoses attribuables à la consommation de drogues injectables parce que le mode de consommation n'est pas consigné systématiquement dans les enregistrements de décès².

Citation suggérée : Bureau du coroner en chef de l'Ontario, données extraites le 2 décembre 2016 et analysées par la Section d'épidémiologie de Santé publique Ottawa.

Remarque : Les données de 2015 sont préliminaires et pourraient changer une fois la compilation des données de l'année terminée. Les données comprennent les intoxications à la drogue et à un mélange d'alcool et de drogues.

¹ Les surdoses involontaires comprennent les décès considérés comme étant accidentels (89 %) et ceux dont l'intention était indéterminée (11 %).

² Communication personnelle. Andrew Stephen (responsable de la gestion de l'information, Bureau du coroner en chef de l'Ontario) et Louise McNaughton-Filion (coroner régionale principale de la région d'Ottawa), le 14 avril 2016. Santé publique Ottawa.