



Vaccins financés par le secteur public	VPH-9 (Gardasil ^{MD} 9)	Vaccin contre l'hépatite B (Engerix ^{MD} -B, Recombivax ^{MD} HB)	Vaccin antiméningococcique conjugué du groupe ACYW-135 (Menactra ^{MD} , Nimenrix ^{MD} , Menveo ^{MD})
Directives sur l'administration pour les médecins	Commande spéciale seulement : 613-580-6744	Commande spéciale seulement : 613-580-6744	Élèves de la 7 ^e à la 12 ^e année seulement
Admissibilité Par l'intermédiaire des cliniques de SPO*	- Élèves de 7 ^e à 10 ^e année qui commencent ou complètent leur série de VPH - Filles de 11 ^e à la 12 ^e année qui commencent ou complètent leur série de VPH	- Élèves de 7 ^e et de 8 ^e année	- Élèves de la 7 ^e à la 12 ^e année
Nombre de doses	<ul style="list-style-type: none"> • <u>2 doses</u> pour les élèves de 14 ans ou moins • <u>3 doses</u> pour les élèves de 15 ans ou plus 	2 doses (doses de 1 ml)	Une dose
Intervalles minimums entre les doses Consulter le Guide canadien d'immunisation pour connaître les intervalles <i>recommandés</i>	<u>Série de 2 doses</u> à 24 semaines d'intervalle <u>Série de 3 doses</u> <ul style="list-style-type: none"> • 4 semaines entre la dose n° 1 et la dose n° 2 • 12 semaines entre la dose n° 2 et la dose n° 3 • 24 semaines entre la dose n° 1 et la dose n° 3 	<u>Engerix^{MD}-B</u> : 24 semaines d'intervalle <u>Recombivax^{MD}HB</u> : 16 semaines d'intervalle	Une dose seulement

*Vaccins administrés lors des cliniques d'immunisation en milieu scolaire ou des cliniques de rattrapage d'immunisation de Santé publique Ottawa (SPO). Les parents peuvent appeler SPO au 613-580-6744 pour prendre rendez-vous.



Vaccins VPH-9 pour les **sujets à risque élevé** (2019-2020)

Vaccins financés par le secteur public	VPH-9 (Gardasil ^{MD} 9)
Nombre de doses	<p>2 doses pour les personnes de 9 à 14 ans s'identifiant comme des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes*</p> <p>3 doses pour les personnes s'identifiant comme des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes* et qui commencent leur série de vaccins le jour de leur 15^e anniversaire ou après, ainsi que pour les garçons et les hommes de 9 à 26 ans s'identifiant comme des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes* et atteints de certaines affections qui affaiblissent le système immunitaire</p>
Groupes d'âge admissibles à la vaccination financée par le secteur public	Garçons et hommes de 9 à 26 ans
Admissibilité <i>Conformément aux calendriers de vaccination financée par le secteur public en Ontario, décembre 2016, page 5</i>	Hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes* qui n'ont pas encore commencé leur série de vaccins VPH-4
Intervalles minimums entre les doses <i>Consulter le Guide canadien d'immunisation pour connaître les intervalles recommandés</i>	<p><u>Série de 2 doses</u> à 24 semaines d'intervalle</p> <p><u>Série de 3 doses</u> 4 semaines entre la dose n° 1 et la dose n° 2 12 semaines entre la dose n° 2 et la dose n° 3 24 semaines entre la dose n° 1 et la dose n° 3</p>

*Hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes : personnes s'identifiant comme des hommes homosexuels et bisexuels, ainsi que certaines personnes qui s'identifient comme des personnes transgenres

Voir verso