

## AZITHROMYCINE (ZITHROMAX®)

Cet antibiotique est administré par voie orale et est utilisé pour traiter : l'urétrite non gonococcique, la cervicite mucopurulente, la chlamydia et la gonorrhée.

### **Avisez le médecin ou l'infirmière / l'infirmière praticienne des situations suivantes si vous :**

- êtes allergique à un antibiotique ;
- allaitez;
- prenez des médicaments avez récemment reçu un vaccin typhoïdique ou le vaccin BCG;
- présentez un intervalle QT long à l'électrocardiogramme, ou vous avez une faible concentration sanguine de magnésium ou de potassium ;
- souffrez de myasthénie;
- avez des antécédents de maladie hépatique ou rénale.

### **Effets secondaires possibles:**

- nausées, vomissements ou diarrhée;
- douleurs abdominales ou perte d'appétit ;
- démangeaisons ou pertes vaginales.

### **Prise de ce médicament**

- Prenez les quatre comprimés en même temps, en une seule dose.
- Ce médicament peut être pris avec ou sans nourriture.
- Ne partagez-pas votre médication.

### **Précautions à prendre après la prise de ce médicament**

- Veuillez ne pas avoir de relations sexuelles durant les prochains 7 jours.
- Veuillez ne pas avoir de relations sexuelles avec des partenaires non-traités.
- Si vous vomissez moins d'une heure après avoir pris le médicament, vous devez retourner à la clinique pour recevoir un autre traitement. La consommation d'alcool peut augmenter le risque de vomissement
- Attendez au moins 2 heures avant de prendre des antiacides (Tums, Roloids, Maalox)
- Cherchez des soins médicaux d'urgence si vous souffrez des symptômes suivants après avoir pris ce médicament : démangeaisons, serrement dans la poitrine ou la gorge, difficultés respiratoires, vomissements ou gonflement de la bouche, du visage ou de la gorge.

### **Conservation**

- Ce médicament est souvent administré en clinique. Il doit être conservé à la température ambiante et tenu hors de la portée des enfants et des animaux.