

Pénicilline G benzathine (Bicillin®L-A)

Cet antibiotique est le traitement privilégié de la syphilis et est injecté.

Avisez le médecin ou l'infirmière praticienne ou l'infirmière des situations suivantes si vous :

- êtes allergique à une forme de pénicilline ou à tout autre antibiotique ;
- êtes enceinte ou si vous allaitez ;
- prenez des médicaments ou avez récemment reçu un vaccin typhoïdique ou le BCG;
- avez déjà souffert de néphropathie ou de troubles convulsifs.

Effets secondaires possibles

- Douleur et sensibilité au point d'injection.
- Nausées, vomissements, diarrhée, étourdissements ou fatigue.
- Consultez si vous souffrez de diarrhée grave après avoir pris ce médicament.
- Une **réaction de Jarisch-Herxheimer** (fièvre, frissons, maux de tête, symptômes semblables à ceux de la grippe) peut se produire de 4 à 12 heures après le traitement. **Il ne s'agit pas d'une réaction allergique.** Souvent, ne dure pas plus de 24 heures.

Prise du médicament

- Une dose suffit généralement pour traiter la syphilis récente. Dans le cas d'une infection présente depuis plus d'un an ou depuis une durée inconnue, le traitement dure trois semaines.
- Il est administré en deux injections intramusculaires dans chaque hanche.
- Après avoir reçu les injections, vous devez attendre **15 minutes** avant de quitter.

Réduction de la douleur au point d'injection

- Massez la région sensible tout de suite après l'injection ; appliquez des compresses chaudes ou froides (15 minutes à la fois) ; prenez un bain chaud.

Précautions à prendre après la prise de cette médication

- Attendez 14 jours avant d'avoir des relations sexuelles.
- Si les symptômes persistent, consultez votre fournisseur de soins de santé.
- Ce médicament peut causer des étourdissements : Évitez de pratiquer des activités qui nécessitent de la vigilance.
- Avisez un membre du personnel ou cherchez à obtenir des soins médicaux d'urgence si vous souffrez des symptômes suivants : éruptions cutanées, démangeaisons, serrement dans la poitrine ou la gorge, difficultés respiratoires, vomissements ou gonflement de la bouche, du visage ou de la gorge.