

Cefixime (Suprax®)

Cette médication est prise par la bouche pour traiter la gonorrhée.

Avisez le médecin, l'infirmière praticienne ou l'infirmière des situations suivantes :

- vous êtes allergique à un antibiotique ;
- vous prenez des médicaments ou avez récemment reçu un vaccin typhoïdique ou le BCG.

Effets secondaires possibles :

- nausées, vomissements, diarrhée ;
- maux d'estomac, brûlement d'estomac.

Prise du médicament

- Prenez une seule dose.
- Ce médicament peut être pris avec ou sans nourriture.

Précautions à prendre après la prise de ce médicament

- Veuillez ne pas avoir de relations sexuelles durant les prochains 7 jours.
- Veuillez ne pas avoir de relations sexuelles avec des partenaires non-traités
- Si vous vomissez durant l'heure suivant la prise de ce médicament. Veuillez retourner à la clinique pour recevoir un autre traitement. L'alcool augmente le risque de vomissement.
- Cherchez des soins médicaux d'urgence si vous souffrez des symptômes suivants après avoir pris ce médicament : démangeaisons, serrement dans la poitrine ou la gorge, difficultés respiratoires, vomissements ou gonflement de la bouche, du visage ou de la gorge

Conservation:

- Ce médicament est souvent administré en clinique. Il doit être conservé à la température ambiante et tenu hors de la portée des enfants et des animaux.