

Ceftriaxone

Cet antibiotique est injecté dans la hanche. C'est le traitement de choix pour la gonorrhée, l'inflammation pelvienne et l'épididymite.

Avisez le médecin, l'infirmière praticienne ou l'infirmière des situations suivantes si vous :

- êtes allergique aux céphalosporines, la lidocaïne et d'autres antibiotiques ;
- si vous allaitez ou êtes enceinte ;
- prenez des médicaments ou avez récemment reçu le vaccin typhoïdique ou le BCG.

Effets secondaires possibles:

- Diarrhée, nausée, vomissements ou maux de tête.

Administration du médicament

- Vous recevez une injection intramusculaire dans la hanche.
 - Pour réduire la douleur on mélange la médication avec de la lidocaïne un anesthésique.

Réduction de la douleur au point d'injection

- Appliquez des compresses chaudes ou froides (15 minutes à la fois) ; prenez un bain chaud.

Précautions à prendre après la prise de ce médicament :

- Vous ne devez pas avoir de relations sexuelles dans les 7 jours suivant.
- Veuillez ne pas avoir de relations sexuelles avec des partenaires non-traités.
- Consultez votre médecin si après l'injection vous développez :
 - Maux de ventre sévères et douleur au dos, étourdissements, faiblesse, fièvre
 - Urine foncée, jaunissement de la peau et des yeux
 - Diarrhée (liquide ou avec présence de sang)
- Après avoir reçu les injections, vous devez attendre **15 minutes** avant de quitter.
- Avisez un membre du personnel ou cherchez à obtenir des soins médicaux d'urgence si vous souffrez des symptômes suivants : éruptions cutanées, démangeaisons, serrement dans la poitrine ou la gorge, difficultés respiratoires, vomissements ou gonflement de la bouche, du visage ou de la gorge.