

## Outil d'évaluation de l'immunisation

Âge auquel l'administration du vaccin est recommandée	Calendrier de vaccination financée par le secteur public en Ontario pour les enfants de moins de quatre ans fréquentant un centre de garde											
	PediaceL, PentaceL (DCaT-VPI-Hib)					Rotarix (RV1) <sup>1</sup> Rotateq (RV5) <sup>2</sup>	Prevnar 13 (Pneu-C-13)	Priorix, MMR II (RRO)	Varilix, Varivax (Var)	Menjugate, Meningitec, Neisvac-C (Men-C-C)		
	Diptérie	Tétanos	Coqueluche	Poliomyélite	Haemophilus Influenzae B (Hib)	Vaccin antirotavirus	Vaccin anti-pneumococcique	Rougeole	Oreillons	Rubéole	Varicelle	Vaccin anti-méningocoque
2 mois	Dose 1											
4 mois	Dose 2											
6 mois	Dose 3											
12 mois Doit être reçu le jour du 1 <sup>er</sup> anniversaire de l'enfant ou après							Dose 3	Dose 1			Dose 1	
15 mois										Dose 1		
18 mois	Dose 4											
Nombre de doses devant avoir été administrées à l'âge de 18 mois	4					2 ou 3	3				1	

<sup>1</sup> Rotarix – 2 doses administrées à 2 et 4 mois.

<sup>2</sup> Rotateq – 3 doses, administrées à 2, 4 et 6 mois.

Adapté de : Calendriers de vaccination financée par le secteur public en Ontario (décembre 2016) [http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/immunization/docs/immunization\\_schedule.pdf](http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/immunization/docs/immunization_schedule.pdf).

07/2019-SPO