

Doxycycline (Vibramycin)

Cet antibiotique est administré par voie orale et est utilisé pour traiter la chlamydia, la gonorrhée, l'épididymite, la syphilis, l'urétrite non gonococcique, une inflammation pelvienne et autres problèmes gynécologiques.

Avisez le médecin, l'infirmière praticienne ou l'infirmière des situations suivantes :

- êtes enceinte ou vous allaitez – Ne pas prendre ce médicament ;
- vous êtes allergique à un antibiotique ;
- si vous prenez des anticoagulants ;
- vous prenez de l'Accutane, des médicaments ou avez récemment reçu un vaccin typhoïdique ou le BCG.

Effets secondaires possibles

- Sensibilité accrue de la peau au soleil - Appliquez de l'écran solaire et évitez les cabines de bronzage pendant que vous prenez ce médicament.
- Nausées, vomissements, diarrhée, maux d'estomac ou perte de l'appétit possibles

Prise du médicament

- Prenez les comprimés avec un grand verre d'eau et de la nourriture
- Poursuivez le traitement jusqu'à la fin, même si vos symptômes s'atténuent ou disparaissent après quelques jours
- Si vous oubliez un comprimé, prenez-le dès que possible, à moins que ce soit le moment de prendre la dose suivante
- Ne partagez pas votre médication

Précautions pendant la prise de cette médication

- Compléter le traitement avant d'avoir des relations sexuelles
- Veuillez ne pas avoir de relations sexuelles avec des partenaires non-traités
- Ne prenez pas d'antiacides (Tums, Roloids, Maalox) en même temps que ce médicament Prenez vos comprimés 2 heures avant ou 6 heures après la prise d'antiacides
- Cherchez des soins médicaux d'urgence si vous souffrez des symptômes suivants après avoir pris ce médicament : démangeaisons, serrement dans la poitrine ou la gorge, difficultés respiratoires, vomissements ou gonflement de la bouche, du visage ou de la gorge

Conservation

- Tenez hors de la portée des enfants et des animaux, dans un endroit sombre, à température ambiante.