



CHLAMYDIA

Qu'est-ce que la chlamydia ?

La chlamydia est la plus répandue des infections transmissibles sexuellement (ITS) d'origine bactérienne. Elle est causée par une bactérie appelée *Chlamydia trachomatis*.

Comment se transmet la chlamydia ?

La chlamydia se transmet lors de relations sexuelles vaginales, orales ou anales non protégées avec une personne infectée.

Quels sont les symptômes ?

La plupart des gens ne ressentent aucun symptôme, alors c'est possible de transmettre la chlamydia à votre partenaire sans même savoir que vous êtes infecté. Le test de dépistage est le seul moyen de savoir si vous avez la chlamydia. Si des symptômes se manifestent, ils apparaissent habituellement dans les deux à six semaines suivant l'exposition à la bactérie.

- Changements des pertes vaginales
- Sensation de brûlure en urinant
- Douleur au bas du ventre
- Douleur pendant les relations sexuelles
- Saignements après les relations sexuelles ou saignement entre les menstruations
- Douleur, perte ou démangeaisons rectale
- Écoulement clair ou laiteux provenant du pénis
- Sensation de brûlure ou démangeaisons sur le gland du pénis
- Douleur ou enflure aux testicules

Comment se fait le dépistage ?

- Une analyse d'un échantillon d'urine peut dépister une infection de la région génitale.
- Un professionnel de la santé peut également obtenir un prélèvement du col de l'utérus, de l'urètre, de la gorge ou du rectum à l'aide d'un coton-tige.

Comment traite-t-on la chlamydia ?

- La chlamydia se traite facilement à l'aide d'antibiotiques.
- Il est important de ne pas avoir de relations sexuelles pendant la durée du traitement et pendant les sept jours après le traitement.

- Assurez-vous que votre partenaire a aussi suivi le traitement avant de recommencer à avoir des relations sexuelles.
- Vous pouvez contracter l'infection de nouveau après le traitement.

Complications possibles :

- Inflammation pelvienne (une inflammation de l'utérus, des trompes de Fallope et des ovaires)
- Stérilité (incapacité de devenir enceinte)
- Grossesse ectopique (grossesse tubaire). Les bébés nés de personnes infectées par la chlamydia peuvent souffrir de graves infections aux yeux ou de pneumonie.
- L'infection peut s'étendre aux testicules.

Rappelez-vous :

Toute infection des parties génitales peut augmenter le risque d'infection par le VIH. Les pratiques sexuelles recommandées comprenant l'utilisation de condoms en latex ou en polyuréthane et/ou de digues buccales lors des relations orales, anales ou vaginales peuvent réduire les risques d'infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).

Appelez la **Ligne d'info de santé sexuelle de l'Ontario** au 1-800-668-2437 si vous avez des questions ou avez besoin d'aide.

Pour de plus amples renseignements :

www.sexandu.ca

Le Centre de Santé-Sexualité

179, rue Clarence

Ottawa K1N 5P7

613-234-4641 ATS: 613-580-9656

www.SantePubliqueOttawa.ca