

Guide de décision pour le personnel présentant des symptômes de la COVID-19 à l'école

En vigueur à partir du 28 septembre 2021

* Les membres du foyer* qui sont entièrement vaccinés et qui ne présentent aucun symptôme de la COVID-19 n'ont pas besoin d'être isolés en attendant les résultats du test de la personne symptomatique.

Entièrement vacciné(e) signifie qu'il s'est écoulé **au moins 14 jours** depuis l'obtention:

- d'une série complète d'un vaccin contre la COVID-19 ayant été approuvé par Santé Canada (p. ex., deux doses de Moderna, Pfizer BioNTech ou AstraZeneca/COVISHIELD, **OU** une dose de Janssen [Johnson & Johnson]) ou toute combinaison de ces vaccins **OU**
- d'une ou deux dose(s) de vaccin contre la COVID-19 n'ayant pas été approuvé par Santé Canada (p. ex., Sinopharm) suivi d'une dose d'un vaccin à ARNm contre la COVID-19 ayant été autorisé par Santé Canada (p. ex., Pfizer-BioNTech ou Moderna); **OU**
- trois doses d'un vaccin contre la COVID-19 n'ayant pas été autorisé par Santé Canada (p. ex., Abdala).

LE MEMBRE DU PERSONNEL devient malade à l'école

Le membre du personnel et les membres de son foyer* qui ne sont pas entièrement vaccinés doivent quitter afin de s'isoler à la maison.

Le membre du personnel qui a des symptômes a-t-il été testé?

Mesures de PCI : nettoyer en profondeur la salle de classe conformément aux lignes directrices du Ministère.

PCI – Prévention et contrôle des infections

ÉPI – Équipement de protection individuelle

FSS – Fournisseur de soins de santé

SPO – Santé publique Ottawa

OUI

NON

Le membre du personnel présentant des symptômes et les membres de son foyer* qui ne sont pas entièrement vaccinés doivent s'isoler à la maison.

Résultat reçu

Positif

Négatif

Le membre du personnel qui a obtenu un résultat positif au test et les membres de son foyer* qui ne sont pas entièrement vaccinés restent en isolement et suivent les directives de SPO.

Le membre du personnel qui présente des symptômes doit s'isoler jusqu'à l'amélioration de ses symptômes depuis 24 heures. Les membres de son foyer peuvent mettre fin à leur isolement s'ils ne ressentent pas de symptômes.

Le membre du personnel qui présente des symptômes doit s'isoler pendant au moins 10 jours et jusqu'à l'amélioration de ses symptômes depuis 24 heures avant de reprendre le travail. Les membres de son foyer* doivent s'isoler pendant au moins 10 jours, à moins d'être entièrement vaccinés. Les membres de son foyer* peuvent mettre fin à leur isolement s'ils ne présentent aucun symptôme.

Le membre du personnel a un diagnostic alternatif fourni par le FSS.

Le membre du personnel qui présente des symptômes doit s'auto-isoler jusqu'à 24 heures après l'amélioration des symptômes. Les membres de son foyer* peuvent mettre fin à leur isolement.

Symptômes de COVID-19

Type	Symptômes
<p>Symptômes les plus fréquents de la COVID-19</p> <p>Pour les adultes (18 ans et plus) qui ne sont pas considérés comme des contacts à haut risque, vous devez effectuer un test de dépistage de la COVID-19 pour les symptômes suivants, même si vous êtes entièrement vacciné(e) :</p> <p>Si vous présentez un ou plusieurs de ces symptômes et que vous choisissez de ne pas vous faire tester, vous devez vous auto-isoler pendant 10 jours.</p>	<p>(Choisissez tout symptôme qui est nouveau ou qui s'aggrave et qui est sans lien avec d'autres causes ou problèmes de santé connus préexistants).</p> <p>IMPORTANT : Toute personne présentant l'un des symptômes énumérés dans le tableau peut être testée.</p> <p>Fièvre ou frissons (température de 37,8 degrés Celsius ou de 100 degrés Fahrenheit ou plus)</p> <p>Toux ou toux aboyante (croup) (un bruit continu de sifflement en respirant ou plus prononcé que d'habitude [sans lien avec l'asthme, une réaction des voies respiratoires après une infection, MPOC])</p> <p>Essoufflement (manque de souffle, incapacité à respirer profondément [sans lien avec l'asthme])</p> <p>Baisse ou perte de l'odorat ou du goût (sans lien avec des allergies, des troubles neurologiques)</p> <p>Douleurs musculaires ou articulaires (inexpliquées ou inhabituelles ou prolongées [sans lien avec des lésions soudaines, la fibromyalgie ou recevoir un vaccin contre la COVID-19 au cours des 48 dernières heures])</p> <p>Fatigue extrême, manque d'énergie ou ne pas se sentir bien (inattendus et inhabituels [sans lien avec la dépression, l'insomnie, le trouble de la thyroïde ou recevoir un vaccin contre la COVID-19 au cours des 48 dernières heures])</p>
<p>Autres symptômes de la COVID-19</p> <p>Les symptômes suivants nécessitent un test de dépistage pour la COVID-19 si vous avez été identifié comme un contact à haut risque, même si vous êtes entièrement vacciné(e).</p> <p>Si vous présentez un ou plusieurs de ces symptômes, vous devez vous auto-isoler (c'est-à-dire rester à la maison sauf en cas d'urgence médicale ou pour effectuer un test de dépistage de la COVID-19) pendant au moins 24 heures jusqu'à ce que les symptômes s'améliorent :</p> <p>Si vous n'avez pas été identifié(e) comme un contact à haut risque, vous pouvez toujours vous faire tester, mais ce n'est pas obligatoire pour retourner au travail ou à l'école.</p> <p>Pour plus d'informations, veuillez consulter les pages sur l'auto-isolement pour le nouveau coronavirus (COVID-19) et sur les contacts à haut risque de la COVID-19.</p>	<p>Mal de gorge (douleur ou difficulté à avaler [sans lien avec les allergies saisonnières, l'écoulement post-nasal, le reflux d'acide])</p> <p>Nez qui coule ou qui est congestionné (sans lien avec les allergies saisonnières, être à l'extérieur à de froides températures, sinusite chronique qui demeure inchangée par rapport au point de référence)</p> <p>Conjonctivite (inflammation de l'œil) (sans lien avec la blépharite, des orgelets récurrents)</p> <p>Baisse ou manque d'appétit (sans lien avec l'anxiété ou la constipation)</p> <p>Douleur abdominale (persistante constante [sans lien avec des crampes menstruelles, reflux gastro-oesophagien])</p> <p>Maux de tête (nouveaux et persistants, inhabituels, inexpliqués ou de longue durée [sans lien avec la céphalée de tension, les migraines chroniques ou recevoir un vaccin contre la COVID-19 au cours des 48 dernières heures])</p>

*****Veuillez noter que si vous avez été identifié(e) comme un contact à haut risque, vous devez subir un test de dépistage pour N'IMPORTE LEQUEL des symptômes énumérés ci-dessus. Même si votre test est négatif, si vous n'êtes pas complètement vacciné(e), vous devez rester en auto-isolement pendant 10 jours après votre dernière exposition à une personne atteinte de la COVID-19, ou selon les instructions de SPO. Pour plus d'informations, veuillez consulter les pages web sur l'auto-isolement pour le nouveau coronavirus (COVID-19) et sur les contacts à haut risque.**