

Guide de décision pour les élèves présentant des symptômes de la COVID-19 à l'école

En vigueur à partir du 23 septembre 2021

L'ÉLÈVE devient malade à l'école

L'enfant se rend dans la salle d'isolement

L'école appelle le parent / tuteur pour venir chercher l'élève

L'école détermine si d'autres membres du foyer* qui ne sont pas entièrement vaccinés se trouvent dans l'école.

Le membre du personnel qui supervise l'enfant utilise une trousse d'ÉPI

L'élève qui a des symptômes a-t-il été testé?

L'élève et les autres membres du foyer* qui ne sont pas entièrement vaccinés reçoivent, en quittant l'école, la lettre de SPO: «Votre enfant a présenté des symptômes à l'école». L'élève et les membres du foyer* qui ne sont pas entièrement vaccinés s'isolent à la maison.

Mesures de PCI : nettoyer en profondeur la salle d'isolement conformément aux directives du ministère

PCI – Prévention et contrôle des infections
ÉPI – Équipement de protection individuelle
FSS – Fournisseur de soins de santé
SPO – Santé publique Ottawa

OUI

NON

L'élève qui a un/des symptôme(s) et les membres de son foyer* qui ne sont pas entièrement vaccinés restent en isolement à la maison.

Résultat reçu

Positif

Négatif

L'élève qui a des symptômes doit s'auto-isoler au moins 10 jours et ses symptômes doivent s'être améliorés depuis 24h OU 48 heures s'être écoulées depuis la fin des vomissements ou de la diarrhée avant qu'il retourne à l'école. Les membres du foyer* doivent s'auto-isoler pendant au moins 10 jours. La période d'isolement de 10 jours des membres du foyer qui ne sont pas entièrement vaccinés commence après qu'ils aient été en mesure de rompre le contact avec l'enfant symptomatique***.

OU

Les parents peuvent communiquer avec le professionnel de la santé de l'élève pour conseils, évaluations ou traitements additionnels. L'élève présentant un/des symptôme(s) et les membres du foyer* qui ne sont pas entièrement vaccinés restent isolés à la maison.

L'élève qui a obtenu un résultat positif au test et les membres du foyer qui ne sont pas entièrement vaccinés restent en isolement et suivent les directives de SPO.

Les membres de son foyer qui sont asymptomatiques peuvent mettre fin à leur auto-isolement, et l'élève peut retourner à l'école ou au service de garde 24 heures après l'amélioration des symptômes** OU 48 heures après avoir cessé de vomir ou d'avoir la diarrhée.

Un médecin ou un infirmier praticien conclut que les symptômes ne sont pas ceux de la COVID-19, fournit un diagnostic alternatif, ET les symptômes s'améliorent** depuis 24 heures OU 48 heures après la fin des vomissements ou de diarrhée. Les membres de son foyer qui n'ont pas de symptômes peuvent cesser de s'auto-isoler lorsque le diagnostic alternatif est reçu.

* Les membres du foyer* qui sont entièrement vaccinés et qui n'ont aucun symptôme de la COVID-19 n'ont pas besoin de s'isoler en attendant les résultats du test de dépistage de l'enfant symptomatique. Si un enfant n'est PAS testé, les membres du foyer entièrement vaccinés n'ont pas besoin de s'isoler, mais ils devraient se soumettre à des tests et surveiller les symptômes.

Entièrement vacciné(e) signifie qu'il s'est écoulé au moins 14 jours depuis l'obtention:

- d'une série complète d'un vaccin contre la COVID-19 ayant été approuvé par Santé Canada (p. ex., deux doses de Moderna, Pfizer BioNTech ou AstraZeneca/COVISHIELD, **OU** une dose de Janssen [Johnson & Johnson]) ou toute combinaison de ces vaccins **OU**
- d'une ou deux dose(s) de vaccin contre la COVID-19 n'ayant pas été approuvé par Santé Canada (p. ex., Sinopharm) suivi d'une dose d'un vaccin à ARNm contre la COVID-19 ayant été autorisé par Santé Canada (p. ex., Pfizer-BioNTech ou Moderna); **OU**
- trois doses d'un vaccin contre la COVID-19 n'ayant pas été autorisé par Santé Canada (p. ex., Abdala).

**REMARQUE : Les symptômes légers comme l'écoulement nasal n'ont pas besoin d'avoir totalement cessé lorsque votre enfant retourne à l'école, pourvu que ses symptômes s'améliorent et que les autres symptômes aient disparu.

***S'il n'y a pas de bris de contact avec la personne symptomatique, les membres du foyer doivent commencer leur isolement de 10 jours à la fin de la période d'isolement de la personne symptomatique. Il en résulte une période d'isolement d'au moins 20 jours (10 + 10 jours).

Ces instructions ne s'appliquent pas aux élèves symptomatiques qui ont été identifiés comme étant des contacts à haut risque d'une personne ayant obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19.

Symptômes de la COVID-19 chez les enfants

Type	Symptômes
<p>Symptômes les plus fréquents de la COVID-19</p> <p>Symptômes les plus courants associés à l'infection à la COVID-19</p> <p>Les enfants qui présentent l'un de ces symptômes devraient rester à la maison, s'isoler et faire un test de dépistage de la COVID-19 dès que possible</p>	<p>Fièvre (température de 37,8 °C/100,0 °F ou plus)</p> <p>Frissons</p> <p>Toux (plus que d'habitude s'il s'agit d'une toux chronique) y compris la laryngite diphtérique « croup » (toux rauque, respiration sifflante) sans lien avec d'autres causes ou affections connues (par exemple, asthme, réaction respiratoire)</p> <p>Essoufflement (dyspnée, incapacité à respirer profondément, respiration sifflante plus grave que d'habitude en cas d'essoufflement chronique) sans lien avec d'autres causes ou problèmes connus (par exemple l'asthme)</p> <p>Baisse ou perte de l'odorat ou du goût (nouveau trouble de l'odorat ou du goût) sans lien avec d'autres causes ou affections connues (par exemple, polypes nasaux, allergies, troubles neurologiques)</p> <p>Nausée, vomissements et (ou) diarrhée, sans lien avec d'autres causes ou affections connues (par exemple, vomissements transitoires dus à l'anxiété chez l'enfant, trouble vestibulaire chronique, syndrome du côlon irritable, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, effet secondaire d'un médicament)</p>
<p>Autres symptômes de la COVID-19</p> <p>Les enfants qui présentent un ou plusieurs de ces symptômes doivent rester à la maison et s'isoler.</p> <p>Les enfants qui sont des contacts à haut risque* doivent subir un test de dépistage de la COVID-19 le plus tôt possible.</p> <ul style="list-style-type: none"> Les contacts du foyer (y compris les frères et sœurs) qui n'ont pas de symptômes et qui sont entièrement vaccinés* n'ont pas besoin de s'isoler. Les contacts du foyer qui présentent des symptômes OU qui ne sont pas entièrement vaccinés doivent s'isoler. <p>Les enfants qui ne sont pas des contacts à haut risque n'ont pas besoin de faire un dépistage, mais doivent rester à la maison jusqu'à ce que les symptômes s'améliorent pendant 24 heures.</p> <ul style="list-style-type: none"> Les contacts du foyer (y compris les frères et sœurs) qui n'ont pas de symptômes n'ont pas besoin de s'isoler et peuvent quitter le foyer. 	<p>Mal de gorge (douleur ou difficulté à avaler) sans lien avec d'autres causes ou affections connues (par exemple, écoulement post-nasal, reflux gastro-œsophagien [reflux gastrique])</p> <p>Nez bouché et (ou) écoulement nasal (congestion nasale et [ou] rhinorrhée) sans lien avec d'autres causes ou affections connues (par exemple, allergies saisonnières, retour à l'intérieur après avoir été exposé au froid, sinusite chronique qui demeure inchangée par rapport au point de référence, réaction respiratoire)</p> <p>Conjonctivite (non liée à la blépharite ou à des orgelets récurrents)</p> <p>Perte ou manque d'appétit (sans lien avec l'anxiété, la constipation)</p> <p>Maux de tête qui sont nouveaux et persistants, inhabituels, inexpliqués ou de longue durée non liée à des causes ou à des affections connues (par exemple, céphalée de tension, migraines chroniques) et non liés à des causes.</p> <p>Fatigue extrême, manque d'énergie ou malaise (inhabituel ou inattendu [non lié à d'autres causes ou problèmes connus ou à la réception d'un vaccin contre la COVID-19 au cours des 48 dernières heures]).</p> <p>Douleurs musculaires (non expliquées ou inhabituelles [non liées à d'autres causes ou problèmes connus ou à la réception d'un vaccin contre la COVID-19 au cours des 48 dernières heures]).</p>