



CERVICITE MUCOPURULENTE

Qu'est-ce que la cervicite mucopurulente ?

La cervicite mucopurulente est une inflammation du col de l'utérus qui peut être causée par divers virus ou bactéries, qui peuvent être transmis sexuellement. Les symptômes peuvent apparaître d'une à six semaines après l'exposition.

Comment cette infection est-elle transmise ?

La plupart des bactéries et des virus qui causent la cervicite mucopurulente peuvent être transmis pendant les relations sexuelles.

Quels sont les symptômes ?

De nombreuses personnes ne présentent aucun symptôme. Les symptômes possibles sont les suivants :

- Pertes vaginales plus abondantes
- Relations sexuelles douloureuses
- Saignement entre les menstruations ou après les relations sexuelles
- Menstruations plus longues ou plus abondantes

Comment traite-t-on la cervicite mucopurulente ?

On traite la cervicite mucopurulente à l'aide d'antibiotiques. Il est important de n'avoir aucune relation sexuelle pendant le traitement et les sept jours suivant le traitement. Encouragez votre ou vos partenaires à passer un test de dépistage avant de reprendre toute activité sexuelle.

Complications possibles

Si elle n'est pas traitée elle peut entraîner ce qui suit :

- Syndrome inflammatoire pelvien (infection des trompes de Fallope, de l'utérus et des ovaires)
- Stérilité (incapacité de devenir enceinte)
- Grossesse ectopique (tubaire)

Appelez la **Ligne d'info de santé sexuelle de l'Ontario** au 1-800-668-2437 si vous avez des questions ou avez besoin d'aide.

Pour en savoir davantage sur la cervicite mucopurulente, consultez le site Web
www.lesexeetmoi.ca

Le Clinique de Santé-Sexualité

179, rue Clarence,

Ottawa K1N 5P7

613-234-4641 | ATS: 613-580-9656

SantePubliqueOttawa.ca