



CHLAMYDIA

Qu'est-ce que la chlamydia ?

La chlamydia est la plus répandue des infections transmissibles sexuellement (ITS) d'origine bactérienne. Elle est causée par une bactérie appelée Chlamydia trachomatis.

Comment se transmet la chlamydia ?

La chlamydia se transmet lors de relations sexuelles vaginales, orales ou anales non protégées avec une personne infectée. Vous pouvez transmettre la chlamydia à votre partenaire sans même savoir que vous êtes infecté.

Quels sont les symptômes ?

La plupart des gens ne ressentent aucun symptôme. Si des symptômes se manifestent, ils apparaissent habituellement dans les deux à six semaines suivant l'exposition à la bactérie.

- Changements ou augmentation des pertes vaginales
- Sensation de brûlure en urinant
- Douleur au bas-ventre
- Douleur ou saignements pendant les relations sexuelles
- Petites pertes sanglantes ou saignements vaginaux entre les menstruations
- Douleur et/ou perte rectale
- Écoulement clair ou laiteux provenant du pénis
- Sensation de brûlure ou démangeaisons sur le gland ou à l'intérieur du pénis ou près du rectum
- Douleur et/ ou enflure aux testicules

Comment se fait le dépistage ?

- Un prélèvement est effectué dans le col de l'utérus, l'urètre, la gorge ou le rectum à l'aide d'un coton-tige.
- On peut aussi faire une analyse d'urine.
- Le test de dépistage est le seul moyen de savoir si vous avez la chlamydia.

Comment traite-t-on la chlamydia ?

- La chlamydia se traite facilement à l'aide d'antibiotiques.
- Il est important de ne pas avoir de relations sexuelles pendant la durée du traitement et pendant les sept jours après le traitement.
- Assurez-vous que votre partenaire a aussi suivi le traitement avant de recommencer à avoir des relations sexuelles.
- Vous pouvez contracter l'infection de nouveau après le traitement.

Complications possibles :

- Inflammation pelvienne (une inflammation de l'utérus, des trompes de Fallope et des ovaires)
- Stérilité (incapacité de devenir enceinte)
- Grossesse ectopique (grossesse tubaire). Les bébés nés de personnes infectées par la chlamydia peuvent souffrir de graves infections aux yeux ou de pneumonie.
- L'infection peut s'étendre aux testicules.

Rappelez-vous :

Toute infection des parties génitales peut augmenter le risque d'infection par le VIH. Les pratiques sexuelles recommandées comprenant l'utilisation de condoms en latex ou en polyuréthane et/ou de digues buccales lors des relations orales, anales ou vaginales peuvent réduire les risques d'infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).

Appelez la **Ligne d'info sida-santé sexualité** au 1-800-668-2437 si vous avez des questions ou avez besoin d'aide

Pour de plus amples renseignements :

www.sexandu.ca

Le Centre de Santé-Sexualité

179, rue Clarence

Ottawa K1N 5P7

613-234-4641 ATS: 613-580-9656

Santepubliqueottawa.ca

