

# GONORRHÉE

## Qu'est-ce que la gonorrhée?

La gonorrhée est une infection transmissible sexuellement (ITS) causée par une bactérie appelée *Neisseria gonorrhoea*. C'est la deuxième infection bactérienne la plus répandue.

## Comment se transmet la gonorrhée?

La gonorrhée se transmet lors de relations sexuelles vaginales, orales ou anales non protégées avec une personne infectée. Vous pouvez transmettre la gonorrhée à votre partenaire sans même savoir que vous êtes infecté.

## Quels sont les symptômes?

La plupart des gens ne ressentent aucun symptôme. Si des symptômes se manifestent, ils apparaissent habituellement deux à sept jours après l'exposition à la bactérie.

- Pertes vaginales ou rectales épaisses et jaunâtres
- Sensation de brûlure en urinant
- Douleur au bas-ventre
- Douleur ou saignements vaginaux pendant les relations sexuelles
- Saignements vaginaux anormaux
- Mal de gorge
- Écoulement épais jaune-verdâtre provenant du pénis ou du rectum
- Sensation de brûlure ou démangeaisons sur le gland, à l'intérieur du pénis ou près du rectum
- Douleur et/ou enflure aux testicules
- Douleur et/ou perte rectale

## Comment se fait le dépistage ?

Un prélèvement est effectué dans le col de l'utérus, l'urètre, la gorge ou le rectum à l'aide d'un coton-tige. On peut aussi faire une analyse d'urine. Le test de dépistage est le seul moyen de savoir si vous avez la gonorrhée.

## Comment traite-t-on la gonorrhée ?

La gonorrhée se traite et se guérit facilement à l'aide d'antibiotiques. Dans certaines régions du Canada et ailleurs dans le monde, la gonorrhée peut être résistante à certains antibiotiques. Veuillez aviser votre médecin si vos partenaires ou vous-même avez effectué des voyages.

Il est important de ne pas avoir de relations sexuelles pendant la durée du traitement et pendant les sept jours qui suivent le traitement. Assurez-vous que votre partenaire a aussi suivi le traitement avant de recommencer à avoir des relations sexuelles. Vous pouvez contracter l'infection de nouveau après le traitement.

### **Complications possibles :**

- Inflammation pelvienne (une infection de l'utérus, des trompes de Fallope et des ovaires et/ou des tissus environnants)
- Stérilité (incapacité de devenir enceinte)
- Grossesse ectopique (grossesse tubaire)
- Les bébés nés infectés par la gonorrhée peuvent souffrir de graves infections aux yeux ou de pneumonie
- L'infection peut s'étendre aux testicules et à la prostate et aller jusqu'à causer la stérilité.

### **Rappelez-vous :**

- Toute infection des parties génitales peut augmenter le risque d'infection par le VIH.
- Les pratiques sexuelles comprenant l'utilisation de condoms en latex ou en polyuréthane et/ou de digues buccales lors des relations orales, anales ou vaginales peuvent réduire les risques d'infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).

Appelez la **Ligne d'info sida-santé sexualité** au 1-800-668-2437 si vous avez des questions ou avez besoin d'aide.

### **Pour de plus amples renseignements :**

[www.sexandu.ca](http://www.sexandu.ca)

### **Le Centre de Santé-Sexualité**

179, rue Clarence

**613-234-4641 ATS : 613-580-9656**

[www.santepubliqueottawa.ca](http://www.santepubliqueottawa.ca)